

Importants

* Situation des pâturages : de façon globale, avec l'entrée de la période de soudure, la disponibilité en fourrage est déficitaire sur presque l'ensemble du pays. Des mesures doivent être prises pour assister les zones à faible disponibilité en pâturages et aussi les zones à contexte sécuritaires instables (par exemple les régions de Tahoua, Diffa, Maradi).

* Situation des termes d'échanges : toujours dans le contexte de soudure, les termes d'échanges représentent un enjeu crucial pour l'éleveur. De façon général, le mois de février affiche une tendance plutôt acceptable bien que la situation est critique dans certaines régions : Maradi, Diffa, le Sud-Est de Dosso. Là aussi, il y'a besoin d'assistance; soit en faisant la sensibilisation au niveau des éleveurs pour qu'ils procèdent à un déstockage ou un appui en nourriture.

Contexte général

Le programme des sites sentinelles initié par le projet Surveillance Pastorale est mis en œuvre par Action Contre la Faim, en collaboration avec Vétérinaires sans Frontières-Belgique et la Direction du Développement Pastoral du Niger.

Un total de 17 sites répartis dans les différentes régions (Maradi, Tahoua, Tillabéry, Zinder, Diffa) et un total de 17 relais choisis parmi les agents du service d'élevage font remonter les informations sur les ressources pastorales (eaux, pâturages, maladies, termes d'échanges) par le canal de SMS. La collecte des données est faite chaque semaine et en temps réel.

Matériels et méthodes

Les données d'Action Contre la Faim et VSF sont collectées par une technique utilisant la téléphonie cellulaire comme canal d'envoi ou de réception des informations pastorales. Ensuite une plateforme web (Telerivet pour Action Contre la Faim et VOTO/ ODK pour VSF) stocke et gère les données reçues. Notons que ces données sont disponibles en fichier CSV pour des analyses.

Ces mêmes données sont cartographiées par Action Contre la Faim en fonction des thématiques reconnues sensibles par la Direction du Développement Pastoral (DDP).


Pour avoir plus d'informations sur les données ou méthodes utilisées, veuillez contacter :

Illiassou Ibrahim (Niger) illiassou@ne.acfspain.org

Alex Merkovic-Orenstein (Sénégal) amerkovic@wa.acfspain.org




ETAT DES PATURAGES-FEVRIER 2017



Pâturages

Avec l'installation de la période de soudure, la tendance de la disponibilité des pâturages est à la baisse voir insuffisante. Sur l'ensemble des zones de surveillance, la disponibilité fourragère est très faible (entre moyenne et insuffisante). Certaines régions sont déjà dans un déficit prononcé des pâturages : Mangayzé à Tillabéry, la région de Tahoua, Gueskerou dans la région de Diffa, la région de Dosso entre autres. Bien qu'il existe quelques exceptions où la production fourragère est toujours bonne malgré la période de soudure, il faut noter aussi que ces zones peuvent être sujettes à des convergences de troupeaux de toute part à la recherche de fourrage et cela pourrait créer un surpâturage dans ces zones.

ETAT DES RESSOURCES EN EAUX-FEVRIER 2017




Ressources en eau

Durant la période de soudure, hormis quelques mares temporaires ou permanentes, l'abreuvement des animaux se fait au niveau des puits. Aussi, on remarque une forte corrélation entre les zones à déficit fourrager et les zones où la disponibilité en eau est insuffisante.

De façon globale, on peut dire que la disponibilité des ressources en eau est moyenne sur l'ensemble de nos sites de surveillance. Les zones situées à l'extrême sud des régions sont généralement exemptes de déficit hydrique à cause de leur situation dans l'isohyète 600 à 1000mm de pluie par an.


LES CAS DE MALADIES-FEVRIER 2017



Maladies

Quelques cas de maladies PPR et PPCB sont observés dans les régions de Tillabéri et Dosso. Néanmoins, il faut noter aussi la présence d'autres maladies comme la pasteuriose, la clavelée, piroplasmose un peu partout sur l'ensemble de nos sites. La classification "Autres" renferme toutes les maladies renseignées ci dessus. Cela a été validé d'un commun accord avec nos relais.


LES TERMES D'ECHANGES-FEVRIER 2017




Termes d'échange

Pour le mois de février, les termes d'échanges sont généralement favorables dans la partie ouest du pays, notamment les régions de Tillabéri et Tahoua, mais avec une forte défaveur des termes dans les contrées de Maradi et Diffa.

Il faut préciser que les termes étant une comparaison entre le prix d'un bouc adulte et un sac de mil de 100kg, ils sont le plus souvent sujet aux fluctuations. Les fluctuations sont régies par la disponibilité du mil, son prix ou aussi la mévente des animaux (forte offre et faible demande). Ainsi, avec la période de soudure qui s'installe, il faut spécifier toujours que les termes sont généralement en défaveur pour l'éleveur, surtout dans les zones où la production agricole (mil) est déficitaire.

FEUX DE BROUSSE-FEVRIER 2017

Feux de brousse


Comme expliqué dans les bulletins précédents, l'occurrence des feux de brousse a lieu le plus souvent dans la saison sèche froide, particulièrement les mois de décembre et janvier. Ainsi une fois la saison des feux passée, on observe une très faible prévalence de cet indicateur sur l'ensemble des régions. Pour ce mois-ci, on a noté un seul cas de feu de brousse au niveau de la région de Zinder, dans le département de Tesker.

LES CAS DE VOLS D'ANIMAUX-FEVRIER 2017

Vols de bétail

Pour le mois de février, on observe une recrudescence des phénomènes de vol sur la quasi-totalité de nos sites. Pour les vols au niveau de Diffa et Zinder, c'est toujours les cas de vol d'asins (expliqués dans le bulletin précédent). Pour Maradi, dans le département de Bermo, on note quelques disparitions de caprins entre autres.

**Anomalie de Production de la biomasse
2016 du Niger**

Anomalie de Production de la Biomasse (Saison des Pluies 2016): Niger



Anomalie (%)

0 - 50 50 - 75 75 - 90 90 - 110 110 - 150 150 - 175 200+



Pour plus d'information merci de visiter le site www.sigsahel.info

La carte d'anomalie montre que la situation globale de la production de la biomasse est meilleure par rapport à la moyenne, mais moins bonne que l'année 2015. C'est le cas de la région de Tahoua (particulièrement dans le département Tchintabaraden) et de la région de Maradi (avec un accent sur le département de Mayahi).

Cependant, on constate aussi des anomalies négatives dans les départements de Gouré et de Tanout (région de Zinder).

Les régions de Diffa et de Tillabéry ont connu une bonne production pour l'année 2016. Néanmoins, compte tenu de l'insécurité dans la région de Diffa, ces zones de pâturage florissantes sont moins accessibles pour les éleveurs, un potentiel facteur de risque pour les ménages et une source de vulnérabilité grandissante.