


Cette période de juin à juillet 2026 correspond à l'installation de la saison d'hivernage sur l'ensemble des zones suivies. Elle est caractérisée par une amélioration progressive des ressources pastorales et des conditions d'abreuvement grâce aux premières pluies. L'état d'embonpoint du cheptel est globalement passable, avec une amélioration progressive observée dans plusieurs zones. Les principaux mouvements enregistrés concernent le retour des troupeaux transhumants en provenance de la Côte d'Ivoire et du Ghana, entraînant des concentrations moyennes à fortes dans certaines zones d'accueil. Plusieurs cas de maladies animales ont été signalés, notamment des pathologies respiratoires et parasitaires favorisées par le début de l'hivernage et la concentration des troupeaux. Bien qu'aucune épizootie majeure n'ait été rapportée, le niveau de risque sanitaire demeure élevé. Les marchés demeurent globalement accessibles et fonctionnels. Les prix des petits ruminants sont en légère baisse tandis que ceux des céréales restent relativement stables. Les termes de l'échange demeurent globalement favorables aux éleveurs malgré des disparités selon les régions.

BURKINA FASO	CÔTE D'IVOIRE	MALI	MAURITANIE	NIGER	SÉNÉGAL
Installation de la saison d'hivernage Concentration moyenne à forte du bétail Baisse des prix de petits ruminants et des céréales Disponibilité des ressources pastorales Termes de l'échange favorable aux éleveurs	Conditions favorables de ressources en pâturage et en eau Bonne disponibilité fourragère mais accès limité dans certaines zones Vols de bétail Foyers de maladies actifs à Ouangolodougou (fièvre aphteuse bovine), à Nafana et à Téhini Termes de l'échange défavorables et en dégradation	Pluviométrie irrégulière observée et prolongation de la soudure pastorale Dégradation généralisée des ressources pastorales Marchés fonctionnels et termes de l'échange favorables Faible niveau d'appui au secteur pastoral Amélioration relative de la situation sécuritaire mais persistance des vols de bétail	Démarrage de l'hivernage Lancement de la campagne nationale de l'ensemencement aérien et des activités de la semaine de l'arbre Suspension toujours effective de la transhumance transfrontalière Mauritanie/Mali État des pâturages déficitaire à moyen État d'embonpoint du bétail globalement passable Hausse des prix du bétail Suspensions de maladies animales	Forte pression sur les ressources fourragères et alimentaires du bétail Dégradation de l'état corporel du cheptel Hausse des prix des céréales et de l'aliment bétail Détérioration des termes de l'échange caprin contre mil Baisse du nombre de vols de bétail et des incidents sécuritaires	Installation de l'hivernage Fortes concentrations de bétail observées État d'embonpoint du cheptel s'améliorant globalement Marchés favorables aux éleveurs, avec des prix du bétail élevés Vols de bétail dans plusieurs zones de transhumance



Les données de terrain proviennent d'un réseau de collecteurs appelés sentinelles de surveillance pastorale qui répondent hebdomadairement à un questionnaire portant sur la situation des ressources pastorales, les conditions de l'élevage, l'état de santé et d'embonpoint des animaux, les prix de marché et la présence de conflits ou d'insécurité.

Les données satellitaires dans ce bulletin proviennent du projet RAPP (Rangeland and Pasture Productivity) à l'initiative du GEOGLAM (Group on Earth Observations and its Global Agricultural Monitoring). L'information produite à partir des observations du capteur satellitaire MODIS (NASA) concerne l'anomalie de la fraction d'occupation du sol en végétation humide (photosynthétique active) et sèche (photosynthétique non-active) par rapport à la moyenne calculée depuis 2001.